

Smrekov lubadar močno uničuje gozdove na zgornjem Gorenjskem

Vida PAPLER LAMPE


V GGO Bled je bila v letu 2007 zabeležena rekordna količina lubadark, kar je posledica zimskega snegoloma v letu 2007, ko je bilo na blejskem gozdnogospodarskem območju poškodovane približno 150.000 m³ lesne mase, od tega največ iglavcev. Močan napad lubadarja se stopnjuje v letu 2008, saj je bilo do začetka avgusta odkritih že približno 40.000 m³ lubadark.

Najbolj ogrožene lokacije so pobočja okoli Gorij, Radovna, Zgornjesavska dolina, bohinjska Spodnja dolina in širša okolica Radovljice. Do konca leta pričakujemo rekordnih 60.000 m³ lubadark, kar predstavlja tretjino poseka na tem območju. V letih 2007 in 2008

bo na območni enoti Bled zaradi podlubnikov na golo posekana površina gozda velika približno kot Blejsko jezero.

Na skalnih, zelo strmih legah (varovalni gozdovi) z lubadarji napadenega drevja ne sekamo. Tu zaradi varnosti ljudi pri delu gozd prepustimo naravnemu razvoju in skrbneje čistimo okoliške gospodarske gozdove.

Posek in spravilo opravlja v svojih gozdovih le še 5 % lastnikov gozdov, drugo opravijo usposobljeni izvajalci. Teh v območju primanjkuje tudi zaradi izvajanja sanacije gozdov, poškodovanih v poletnih neurjih.



Slika 1: Posek drevja zaradi smrekovih lubadarjev v Gozdnogospodarskem območju Bled za obdobje 1995–2007 in ocena za leto 2008