



ONKOLOŠKI
INŠITUT
LJUBLJANA

INSTITUTE
OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

Zdravila za uporabo
v paliativni medicini
2. izdaja

ISBN-13: 978-9616071734



9 789616 071734

Izdal:

Onkološki inštitut Ljubljana

Avtorji:

Jožica Červek
Mojca Simončič Godnič
Jernej Benedik
Maja Ebert
Jasenka Gugić Kevo
Slavica Lahajnar-Čavlovič
Petrica Tavčar

Recenzent:

Branko Zakotnik

Tisk knjižice je omogočilo podjetje PharmaSwiss, d. o. o.

2012



ONKOLOŠKI
INŠITUT
LJUBLJANA

INSTITUTE
OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

PREDGOVOR K 2. IZDAJI

V letu 2008 smo izdali prvi priročnik v slovenskem jeziku o paliativni oskrbi: »Pogosta vprašanja v paliativni oskrbi« in ob tem tudi spremljajočo publikacijo za pomoč pri uporabi ključnih zdravil, pri obravnavi najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi.

Zaradi vedno novih možnosti zdravljenja in novih učinkovin je potrebno priporočila redno obnavljati.

Skupaj z zdravniki in ostalimi člani tima za PO na OI smo pripravili posodobljen seznam ključnih zdravil za uporabo pri obravnavi najpogostejših simptomov.

Pri tem smo upoštevali najnovejša priporočila za zdravljenje z zdravili.

Želim, da vam bo posodobljena publikacija v izdatno pomoč pri paliativni oskrbi bolnikov.

Jožica Červek

Januar, 2012

Oznake v besedilu:

* registrirano, zdravilo ni na razpolago

**ni registrirano, nujno zdravilo za uporabo v paliativni medicini

*** na seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (datum objave: 9. 12. 2011)

Zdravila za uporabo v paliativni medicini

SEZNAM KLJUČNIH ZDRAVIL ZA UPORABO V PALIATIVNI MEDICINI

Bolnik v paliativni oskrbi ima zaradi aktivne, napredovale bolezni praviloma vrsto simptomov. Poleg zdravstvene nege in psihosocialne podpore je medikamentozno zdravljenje eden temeljev učinkovite celostne oskrbe takega bolnika.

Za pomoč in učinkovito medikamentozno zdravljenje sta Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodno združenje za Hospice in paliativno oskrbo (IAHPC) sestavila seznam ključnih zdravil za obravnavo najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi.

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije so ključna zdravila, ki so učinkovita pri obravnavi najpogostejših simptomov v paliativni oskrbi.

Zdravila, razvrščena v ta seznam, izpolnjujejo naslednje pogoje: so učinkovita, varna in cenovno sprejemljiva ter dostopna v vseh državah. Zdravila niso izbrana po osebnih in komercialnih interesih. IAHPC ima na svojem seznamu 21 najpogostejših simptomov bolezni in za obravnavo teh simptomov 33 učinkovitih zdravil. Seznam ključnih zdravil se dopoljuje in posodablja vsaki dve leti.

Strokovnjaki s področja paliativne oskrbe si prizadevajo, da je s seznamom ključnih zdravil seznanjen in ga uporablja čim širši krog zdravstvenih delavcev.

Uporabnost mednarodno sestavljenega seznama ključnih zdravil za uporabo v paliativni oskrbi pa je večja, če je ta seznam prilagojen dostopnosti zdravil doma. Na podlagi dostopnosti in registracije zdravil v Sloveniji je nastal nacionalni seznam ključnih zdravil za najpogostejše simptome v paliativni oskrbi, pri katerem je sodelovala skupina zdravnikov, zaposlenih na Onkološkem inštitutu.

Prvi takšen seznam v Sloveniji je bil sestavljen z željo olajšati delo zdravstvenih delavcev v paliativni oskrbi in jim ponuditi ustrezno strokovno pomoč v dobro številnih bolnikov. Strokovnjaki s področja paliativne oskrbe si bomo še naprej prizadevali za redno posodabljanje seznama ključnih zdravil.

Dostopnost in razpoložljivost zdravil za paliativno oskrbo v Sloveniji je dobra, žal pa zgolj dostopnost in razpoložljivost ne zagotavlja ustrezne uporabe.

Jožica Červek in Mojca Simončič

VIRI:

1. De Lima, L., E. L. Krakauer, K. Lorenz, D. Praill, N. MacDonald, & D. Doyle, 2007. Ensuring Palliative Medicine Availability: The Development of the IAHPC List of Essential Medicines for Palliative Care. *Journal of Pain and Symptom Management* 33(5): 521-526.
2. De Lima, L., 2007. International Association for Hospice and Palliative Care list of essential medicines for palliative care. *Annals of Oncology* 18(2): 395-399.
3. WHO Model List of Essential Medicines, 17th list (March 2011) (dosegljivo na: <http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html>)

1. DISPNEJA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Bronhodilatatorji			
Inhalacijski agonisti beta-2 kratko delujoči	Salbutamol VENTOLIN Susp. pod tlakom: 1 vp. = 100 µg Inhal. razt. za nebulator (20 ml): 1 ml = 5 mg	Pršilnik: 1–2 vp./4–6 h + P. p. Inhal.: 0,5–1 ml razredčimo do 2,5 ml s fiziol. razt., do 4×/dan	Palpitacije, tremor skel. mišic, glavobol.
Fenoterol BEROTEC N		Pršilnik: 1–2 vp., do maks. 8×/dan	
Inhalacijski agonisti beta-2 dolgo delujoči	Formoterol OXIS TURBUHALER, ATIMOS Oxis: Prašek za inhaliranje: 4,5 µg (1 vdih = 4,5 µg); 9 µg (1 vdih = 9 µg) Atimos: Inhal. razt. pod tlakom: 1 odmerek = 12 µg	1–2 vdihja, maks. 18–36 µg/dan	
	Salmeterol SEREVENT Inhal. susp. pod tlakom: 1 odmerek = 25 µg	Inhal.: 2–4 odminki 2×/dan	
Inhalacijski antiholinergiki, beta-2 agonist	Fenoterol, ipratropijev bromid BERODUAL Inhal. razt. pod tlakom (10 ml): 1 vp. = 50 µg ipratrop. bromida in 21 µg fenoterola Inhal. razt. za nebulator (20 ml): 1 ml = 20 gtt = 250 µg ipratrop. bromida in 500 µg fenoterola	Pršilnik: 2 vp./6 h + p. p.	Suha usta, zaprtje, zastoj seča.
	Tiotropijev bromid SPIRIVA Kapsule s praškom za inhaliranje: 1 kapsula = 18 µg tiotropija Raztopina za inhaliranje: 1 vpih = 2,5 µg tiotropija	Inhal.: 1 kapsula 1×/dan prek HandiHalerja, 2 vpiha 1×/dan z vdihovalnikom Respimat	

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Kortikosteroidi	Deksametazon DEXAMETHASON Tbl.: 0,5 mg*** Razt. za inj.: 4 mg/1 ml FORTECORTIN Tbl.: 2 mg***	p. o., s. c., i. v., i.m.: 4–8 mg/dan	Gastritis, ulkus, diabetes, ↑ RR, evforija, psihoza, nespečnost, proksimalna miopatija, oralna kandidaža.
	Metilprednizolon MEDROL Tbl.: 4 mg, 16 mg, 32 mg	p. o.: 16–32 mg/dan	
	SOLU-MEDROL Vehikel in prašek za infuzije: 40 mg, 125 mg	s. c., i. v.: 20–40 mg/dan	
Opioidi	Morfini s takojšnjim sproščanjem SEVREDOL Tbl.: 10, 20 mg	p. o.: Začetni odmerek 5–10 mg/4 h + p. p. (ponovimo čez 30 min)	Slabost, bruhanje, zaprtje, zmedenost, zaspanost, respir. depresija.
	MORFINSKE/ ANALGETIČNE KAPLJICE Peroralna raztopina (20 ml) 20 mg = 1 ml = 20 gtt	Peroralna raztopina (20 ml) 20 mg = 1 ml = 20 gtt	
	MORFIN ALKALOID Razt. za inj.: 20 mg/1 ml***	s. c.: Začetni odmerek 5 mg/4 h + p. p. (ponovimo čez 20 min). Če bolnik že prejema opioide, povečamo odmerek za 25 %	
	MSI MUNDIPHARMA Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml***	Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml***	
Anksiolitiki	Lorazepam LORSILAN, LORAM Tbl.: 1 mg, 2,5 mg	p. o. ali sublingv.: 1–2,5 mg/dan, 2×/dan (sublingv. hitreji začetek delovanja)	Sedacija, utrujenost, omotičnost, motnje koncentracije.
	Midazolam DORMICUM, Tbl.: 7,5 mg, 15 mg, Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml MIDAZOLAM TORREX Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml	Začetni odmerek p. o.: 7,5–15 mg s. c.: 2,5 mg i. v.: 1–2 mg	
		Titracija do učinka, ponavljanje p. o. na 30 min h, i. v. na 10–15 min, s. c. na 15–20 min	

2. KAŠELJ

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Mukolitiki/ ekspektoransi	Fiziološka raztopina: 0,9 % NaCl	Inhal.: 2,5 ml/4 h oz. p. p.	Zelo redko, možne gastrointestinalne motnje, alergijske reakcije.
	Jegličev sirup HERBION JEGLIČEV SIRUP	p. o.: 3–4×/dan 1 žlico sirupa	
	Slezov sirup	p. o.: 3–6×/dan 1 žlico sirupa	
	Ekstrakt listov bršljana PROSPAN	p. o.: 3×/dan 5–7,5 ml sirupa 2×/dan 1 šumeče tbl.	
	Sirup (100 ml, 200 ml): 7 mg = 1 ml Šumeče tbl.: 65 mg		
	Gvaifenezin VAPOSIRUP	p. o.: 4–6×/dan 1 merilni lonček sirupa	
	Sirup (120 ml): 200 mg/15 ml (200 mg = 15 ml = 1 merilni lonček)		
	Bromheksin BISOLVON	p. o. razt.: 4 ml 3×/dan	
	Razt. za nebulator (40 ml): 2 mg/ml (1 ml = 15 gtts)	Inhal.: 4 ml 2×/dan	
	Sirup (250 ml): 4 mg = 5 ml = 1 žlička	Sirup: 10 ml 3×/dan	
	Tbl.: 8 mg 3×/dan		
	Acetilcistein FLUIMUKAN	p. o.: 200 mg 3×/dan	
	Granulat (vrečke po 5 g): 100 mg, 200 mg		
	Prašek za peroralno raztopino (3 g): 200 mg		
	Šumeče tablete: 600 mg		
	Ambrosolsk SOLVOLAN	Sirup: 15–30 mg 3×/dan	
	Sirup (100 ml): 15 mg = 5 ml = 1 žlička	Tbl.: 30 mg 2–3×/dan	
	Tbl.: 30 mg		

Periferno delujuči antitusiki

Siripi	Trpotčev sirup HERBION TRPOTČEV SIRUP	p. o.: 3–5×/dan 1 žlico sirupa
--------	---------------------------------------	--------------------------------

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Centralno delujuči antitusiki			
Derivati opioidov	Folkodin FOLKODIN	p. o.: 10–20 mg 3×/dan oz. Kaps.: 10 mg Peroralna razt. (150 ml): 15 mg = 15 ml = 1 velika žlica	Manj sedacije in zaprtja kot pri opioidih.
Dekstrometorfan			
	FORMEL	p. o.: 20 mg do največ 3×/dan Sirup (120 ml): 1 merilni lonček = 15 ml = 20 mg	
Drugi antitusiki	Butamirat PANATUS	p. o.: Tbl. 40–50 mg, 2–3×/dan Tbl.: 20, 50 mg Sirup: 4 mg/5 ml, (200 ml), 7,5 mg /5 ml, (200 ml)	Redko kožni izpuščaji, slabost, bruhanje, driska, zaspanost, vrtoglavica.
	SINECOD	Sirup: 3 žličke 4×/dan oz. 6 žličk, 3–4×/dan Tbl.: 50 mg Sirup: 7,5 mg/5 ml, (200 ml)	
Opioidi	Kodein KODEINJEV	p. o.: 30–60 mg/4–6 h, maks. 240 mg/dan	Zaspanost, zmedenost, slabost, bruhanje, zaprtje.
	FOSFAT	Tbl.: 30 mg	
	KODEINSKE KAPLJICE	(20 ml), 30 mg = 12 gtts = 0,6 ml	
	Dihidrokodein DHC CONTINOUS*	p. o.: 60–90 mg/12 h, maks. 240 mg/dan 120 mg	Zaprtje, slabost, bruhanje, vertigo, zmedenost.
	Morfini s takojšnjim sproščanjem SEVREDOL	p. o.: Začetni odmerek 5–10 mg/4 h + p.p. (ponovimo čez 30 min) Tbl.: 10 mg, 20 mg	Slabost, bruhanje, zaprtje, zmedenost, zaspanost, respir. depresija.
	MORFINSKE/ ANALGETIČNE KAPLJICE	s. c.: Začetni odmerek 5 mg/4 h + p.p. (ponovimo čez 20 min) Peroralna raztopina (20 ml), 20 mg = 1 ml = 20 gtts	
	PERALOG	Če bolnik že prejema opioide, povečamo odmerek za 25 %	
	MORFIN ALKALOID	Razt. za inj.: 20 mg/1 ml***	
	MSI MUNDIPHARMA	Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml***	

3. ZAPRTJE, ZAPORA ČREVESA (ILEUS)

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
ZAPRTJE			
Kontaktna odvajala	Sena VEROLAX SENNA Tbl.: 1 tbl. =15 mg hidroksiantracenskih glikozidov	p. o.: 1-4 tbl. zvečer	Krči v trebuhu (predvsem pri seni), neprimerno ob ileusu.
	BEKUNIS 1 tbl = 20 mg hidroksiantracenskih glikozidov		
	BEKUNIS ZDRAVILNI ČAJ ODVAJALNI ČAJ	p. o.: 1 žlico čaja prelijte z velo vodo, zvečer	Učinek predvidoma v 8-12 h.
	Bisakodil DULCOLAX, Tbl.: 5 mg Svečka 10 mg	p. o.: 5-10 mg zvečer Rektalno: 1 svečka p. p. 1 ×/dan	Učinek po 20-60 min.
	NOVOLAX Tbl.: 5 mg		
Volumska odvajala	Semenska lupina jajčastega trpotca MUCOFALK Zrnca 5 g	p. o.: 5 g zrnc raztopimo v 150 ml vode 2-6×/dan	Potrebitno uživanje velikih količin tekočine, drugače možno poslabšanje zaprtja. Učinek predvidoma v 2-4 dneh.
Osmotska odvajala	Laktuloza (3,335 g/5 ml) PORTALAK Sirup (250 ml, 500 ml) PROREKTAL Sirup (500 ml) LACTECON Tekočina (500 ml)	p. o.: 15-45 ml (1-3 velike žlice)/dan	Flatulenca, krči, pozor pri diabetikih (laktuloza), potrebno jemanje s tekočino (vsaj 1 liter dnevno). Učinek predvidoma v 48 h (laktuloza) oz. v 3-6 h (Donat Mg). Laktitol primeren za diabetike.
	Laktitol IMPORTAL* Vrečke po 10 g	20 g/dan 4-5 dni, nato vzdrževalni odmerek 10 g/dan	
	Donat Mg	Individualno	
Tarčno odvajalo	Metil-naltreksonijev bromid RELISTOR Napolnjena inj. brižga: 12 mg/0,6 ml	s. c.: 12 mg vsak drugi dan	Samo za zdravljenje zaprtosti zaradi opioidov, ko običajno zdravljenje z odvajali ne zadostuje.
Svečke – lubrikanti	Glicerol GLICERINSKE SVEČKE	Rektalno: 1-2 svečki p. p.	Učinek predvidoma v 1-6 h.

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Klizme	Mini klizme: - glicerinska klizma (Glicerol 85 %) 120-150 ml (2-3 60 ml brizge) - mešanica glicerinske klizme in Portalaka: 2/3 Glicerol 85 % + 1/3 Portalak sirup v skupni količini 120-150 ml (2-3 brizge) - fosfatna klizma (Clyssie 120 ml) 120-240 ml - mešanica fosfatne in glicerinske klizme: 1/2 Clyssie + 1/2 Glicerol 85 % v skupni količini 120-150 ml (2-3 brizge)	Rektalno	Učinek predvidoma v 20 minutah.
ZAPORA ČREVESA (ILEUS)			
NEPOPOLNA ZAPORA	Metoklopramid REGLAN	s. c.: 60-240 mg/dan	
	Razt. za inj.: 10 mg/2 ml***		
POPOLNA ZAPORA (ILEUS)	Haloperidol HALDOL Razt. za inj.: 5 mg/1 ml	s. c.: 5-15 mg/dan	Zdravljenje bolečine: fentanil in metadon – manj zaprtja.
	Deksametazon DEXAMETHASON Razt. za inj.: 4 mg/1 ml	s. c.: 6-16 mg/dan	
	Butilskopolamin BUSCOPAN Razt. za inj.: 20 mg/1 ml***	s. c.: 40-120 mg/dan	
	Oktreotid SANDOSTATIN Razt. za inj.: 0,05 mg/1 ml, 0,1 mg/1 ml, 0,5 mg/1 ml	s. c.: 0,2-0,9 mg/dan	

4. IZGUBA TELESNE TEŽE IN APETITA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Prehranska dopolnila	Prehranska dopolnila z omega 3			Spodbujevalci apetita	Progesteroni		Učinek nastopi po dveh tednih in je dolgotrajnejši kot pri kortikosteroidih.
	PROSURE (okusi: banana, pomaranča, vanilija, čokolada) tetrapak 240 ml	p. o.: 2×1 tetrapak/dan	Zelo redko, gastrointestinalne motnje.		Megestrol acetat MEGACE Tbl.: 160 mg Peroralna susp. (240 ml, 40 mg/ml): 10 ml = 400 mg	p. o.: 160–800 mg/dan, običajna doza 400 mg/dan	Retenca tekočine, povečano tveganje za nastanek trombemboličnih zapletov.
	SUPPORTAN (okusi: kapučino, tropski sedeži) Plastenka z 250 ml vsebine (pakirano 4 plastenke skupaj)	p. o.: 2×1 plostenko/dan		Prokinetiki	Metoklopramid REGLAN Tbl.: 10 mg Peroralna razt. (120 ml): 5 mg/5 ml, 5 ml = 1 žlička	p. o.: 10–20 mg 3×/dan, 30 min. pred obrokom, maks. dnevni odmerek 100 mg	Primerni za bolnike z občutkom hitre sitosti, upočasnjeno peristaltiko in slabostjo; kontraindicirani pri zaporu črevesa.
	Druga prehranska dopolnila						Ekstrapiramidna simptomatika.
	ENSURE (polna uravnotežena prehrana, okusi: vanilija, čokolada) Pločevinka 250 ml	p. o.: 2×1 pločevinka/dan			Domperidon TAMETIL Tbl.: 10 mg	p. o.: 10–20 mg 3×/dan, 30 min. pred obrokom	Manj ekstrapiramidne simptomatike kot pri metoklopramidu.
	ENSURE PLUS (visokokalorična in visokobeljakovinska prehrana, okusi: vanilija, čokolada, jagoda) Tetrapak 220 ml	p. o.: 2–3×1 tetrapak/dan		Protivnetra zdravila	NSAID in COX-2 inhibitorji (glej poglavje 10)		Še v kliničnih raziskavah.
	ALITRAQUE (obogaten z glutaminom, za obnovu črevsne sluznice) Vrečke 76 g praška.	p. o.: 2–3×1 vrečko/dan					
Spodbujevalci apetita	Kortikosteroidi		Če v tednu dni ni učinka, zdravljenje prekinemo.				
	Deksametazon DEXAMETHASON Tbl.: 0,5 mg*** Razt. za inj.: 4 mg/1 ml	p. o., s. c., i. v., i. m.: 4–8 mg/dan	Diabetes, gastritis, evforija, anksioznost, depresija, oralna kandidaiza, zvišanje krvnega pritiska, proksimalna miopatija, nespečnost.				
	FORTECORTIN Tbl: 2 mg***						
	Metilprednizolon MEDROL Tbl.: 4 mg, 16 mg, 32 mg	p. o.: 16–32 mg/dan					
	SOLU-MEDROL Vehikel in prašek za infuzije 40 mg, 125 mg	s. c., i. v.: 20–40 mg/dan					

5. SLABOST IN BRUHANJE

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosha	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosha	Stranski učinki in opombe
Antihistaminiki	Dimenhidrinat (sol difenhidridamina) DRAMINA Tbl.: 50 mg	p. o.: 3×50–100 mg/dan, maks. 400 mg/dan	Deluje kot antihistaminik v vestibularnem centru in antimuskarski antiholinergik v prebavilih. Antiholinergični učinki (zamegljen vid, suha usta, palpitacije, zaprtje, urin. retenga), sedacija.		Domperidon TAMETIL Tbl.: 10 mg	p. o.: 3×10 mg, maks. 30 mg/dan	Manj ekstrapiramidne simptomatične učinki kot metoklopramid. Izogibati se sočasni uporabi z antiholinergiki (butilskopolamin).
	Ciklizin**						
Antiholinergiki	Butilskopolamin (= hioscinijev butilbromid) BUSCOPAN Tbl.: 10 mg Razt. za inj.: 20 mg/ml***	p. o.: 3–5×/dan 10–20 mg	Periferen antiholinergik (ne prehaja v CŽS) Antiholinergični učinki.	Serotoninski antagonisti (v paliativnem zdravljenju jih uporabljamo le izjemoma)	Ondansetron SETRONON, ZOFTRAN Tbl.: 4 mg, 8 mg Razt. za inj.: 4 mg/2 ml, 8 mg/4 ml	p. o., i. v.: 8 mg 2–3×/dan	Glavobol, zaprtje.
Nevroleptiki	Haloperidol HALDOL Tbl.: 2 mg, 10 mg Peroralne kapljice: 2 mg/1 ml (10 ml), 1mg=10 gtt=0,5ml 10 mg/1ml (30 ml), Razt. za inj.: 5 mg/1 ml	p. o. (tbl. ali kapslice): 1–2×1–1,5 mg maks. 3–5 mg/dan	Suha usta, ekstrapiramidna simptomatika (pozor pri Parkinsonovi bolezni), posturalna hipotenzija. Izogibati se sočasni uporabi z antiholinergiki (butilskopolamin).		Granisetron KYTRIL, GRANISETRON Tbl.: 2 mg Razt. za inj.: 1 mg/ml, 3 mg/3 ml	p. o., i. v.: 1–2 mg/dan	
	Tietilperazin TORECAN Tbl.: 6,5 mg Svečke: 6,5 mg Razt. za inj.: 6,5 mg/ml	p. o.: 1–3×6,5 mg, maks. 30 mg/dan Rektalno: 1–3×1 svečka (6,5 mg)/dan s.c., i.m., i.v.: 1–3×6,5 mg/dan			Deksametazon DEXAMETHASON Tbl.: 0,5 mg*** Razt. za inj.: 4 mg/1 ml	p. o., s.c., i.v., i.m.: 1 8–16 mg/dan	Gastritis, diabetes, evforija, anksioznost, depresija, ↑ RR, proksimalna miopatija, oralna kandidaza.
	Levomepromazin NOZINAN Tbl.: 25 mg, 100 mg Razt. za inj.: 25 mg/1 ml**	p. o.: 1–2×6,25 mg/dan začetni odmerek, maks. 6,25–25 mg/dan			FORTECORTIN Tbl: 2 mg***		
	Metoklopramid REGLAN Tbl.: 10 mg Peroralna razt.: 5 mg/5 ml (120 ml), 5 mg = 5 ml = 1 žlička Razt. za inj.: 10 mg/2 ml***	p. o.: 3–4×10 mg, maks. 30–100 mg/dan Kont. s.c. (i.v.) inf.: 30–100 mg/dan Maks. 100 mg/dan	Ekstrapiramidna simptomatika (pozor pri Parkinsonovi bolezni) – antidot biperidon (Akineton). Izogibati se sočasni uporabi z antiholinergiki (butilskopolamin).		Metylprednizolon MEDROL Tbl.: 4 mg, 16 mg, 32 mg, SOLU-MEDROL Vehikel in prašek za infuzije 40 mg, 125 mg	p. o., i.v.: 32–64 mg/dan	
Antiemetiki, prokinetiki				Drugo	Diazepam APAURIN Tbl.: 2 mg, 5 mg, 10 mg Razt. za inj.: 10 mg/2 ml	Individualno	
					Lorazepam LORSILAN, LORAM Tbl.: 1 mg, 2,5 mg		

6. DEPRESIJA IN ANKSIOZNOST

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Antidepresivi							
Selektivni inhibitorji ponovnega privzema serotonina (SSRI)	Citalopram CIPRAMIL Tbl.: 20 mg, Razt. za inj.: 20 mg/0,5 ml CITALON Tbl.: 10 mg, 20 mg, 40 mg CITALOX Tbl.: 20 mg	p. o.: 20–40 mg/dan, maks. 60 mg	Pozor pri epilepsiji, ob okvari jeter treba zmanjšati odmerek oz. pogostost jemanja. Povečanje apetita in telesne teže (mirtazapin).	Inhibitorji prevzema serotoninina in noradrenalina	Venlafaksin ALVENTA EFFECTIN ER FAXIPROL Kaps.: 75 mg, 150 mg VENLAGAMMA Kaps.: 37,5 mg, 75 mg, 150 mg	p. o.: 75 mg 1x/dan običajni odmerek, tudi do 375 mg/dan	Zaspanost, nepravilni srčni utrip, zaprtje, vrtoglavica.
	Escitalopram CIPRALEX Tbl.: 10 mg	p. o.: 10 mg/dan, maks. 20 mg/dan		Duloksetin CYMBALTA Kaps.: 30 mg, 60 mg	p. o.: 60 mg/dan	Kontraindikacije: kronična srčna bolezen s tveganjem za aritmijo, neurejen krvni tlak, huda jetra in ledvična insuficiencia.	
	CITAFORT Tbl.: 5 mg, 10 mg, 20 mg ECYTARA ESCITALOPRAM Tbl.: 10 mg			Presinaptični α-2 antagonist s povečanim sproščanjem noradrenalina in serotoninina	Mirtazapin MIRZATEN Tbl.: 30 mg, 45 mg	p. o.: 1×15 mg/dan, odmerek večamo do optimal. kliničnega odgovora, maks. 45 mg/dan	Hitreje deluje, primeren pri bolnikih s slabostjo, vendar lahko povzroča zaspanost, povečuje apetit, pazljivo pri jetri ali ledvični okvari, varen pri starejših bolnikih, epileptikih, diabetikih.
	Paroksetin SEROXAT Tbl.: 20 mg, 30 mg PALUXON	p. o.: 1×20–50 mg/dan, maks. 60 mg/dan, pri starejših 40 mg/dan		Drugí antidepresivi	Tianeptin COAXIL Tbl.: 12,5 mg	p. o.: 3×12,5 mg/dan	Želodčne bolečine, motnje prebave, motnje spanja, razbijanje srca.
	PAROGEN PAROXAT PLISIL Tbl.: 20 mg			Psihostimulansi	Metilfenidat CONCERTA Tbl.: 18 mg, 36 mg, 54 mg RITALIN Tbl.: 10 mg	p. o.: 20–30 mg/dan	Primeren za uporabo pri bolnikih s pričakovano kratko dobo preživetja in hudimi znaki depresije.
	ASENTRA MAPRON SERTIVA SERTRALIN Tbl.: 50 mg, 100 mg	p. o.: 1×50 mg/dan, lahko večamo po 50 mg v teedenških intervalih do maks. 200 mg/dan		Anksiolitiki*	Lorazepam LORAM LORSILAN Tbl.: 1 mg, 2,5 mg LORAZEPAM , Razt. za inj.: 2 mg/1 ml***	p. o. ali sublingv.: 1–2,5 mg/dan, 2–3×/dan (sublingv. hitrejši začetek delovanja)	Sedacija, utrujenost, omotičnost, motnje koncentracije.
Melatonergični antidepresivi	Agomelatin VALDOXAN Tbl.: 25 mg	p. o.: 1×50 mg/dan pred spanjem		Oksazepam OKSAZEPAM PRAXITEN Tbl.: 10 mg	p. o.: 20–30 mg/dan, maks. 60 mg, pri starejših maks. 30 mg		
Triciklični antidepresivi	Amitriptilin AMYZOL Tbl.: 10 mg, 25 mg	p. o.: 10–25 mg zvečer, maks. 150 mg/dan v 3 odmerkih	Suha usta, zaspanost, glavobol, zamegljen vid, hiter srčni utrip, zastajanje seča, zaprtje.				

6. DEPRESIJA IN ANKSIOZNOST

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Anksiolitiki*	Alprazolam HELEX XANAX Tbl.: 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg XANAX SR Tbl. s podaljšanim sproščanjem: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg	p. o.: Začetni odmerek navadno 0,25 mg zvečer, maks. vzdrževalni odmerek 2 mg/8 h	
	Diazepam APAURIN Tbl.: 2 mg, 5 mg, 10 mg Razt. za inj.: 10 mg/2 ml STESOLID Rektalna razt.: 5 mg, 10 mg***	p. o.: 2–5 mg 2–3 ×/dan i. v., i. m., s. c.: 10 mg Rektalno: 10–20 mg, lahko ponovimo 10 mg; starejši bolniki (nad 65 let), oslabeli, bolniki z okvaro jeter, ledvic ali srca: 5 mg	Hiter učinek, primeren ob epileptičnih napadih, dolgo delujoči (1–3 dni, metaboliti 2–7 dni).
	Midazolam DORMICUM Tbl.: 7,5 mg, 15 mg, Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml MIDAZOLAM TORREX Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml	p. o.: 7,5–15 mg s. c., i. m.: 5 mg ponoviti na 30 minut do učinka, nato s. c. kontinuirana infuzija 30–100 mg/24 h i. v.: 1–2 mg (0,25–0,5 mg pri starih, kahektičnih bolnikih) v počasnem bolusu (1 mg/30 s). Titriramo z odmerki po 1 mg do želene sedacije, nato kont. infuzija 20–100 mg/dan	

* Ne v monoterapiji, najpogosteje le kot začasen uvod v antidepresivno zdravljenje.

7. DELIRIJ

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Nevroleptiki in sedativi	Haloperidol HALDOL	Hiperaktivni delirij: p. o., i. m., s. c.: 2,5 mg (stari, kahektični) oz. 5 mg (mladi, če slab odziv pri starejših), 1mg=10 gtt=0,5ml, 10 mg/1ml (30 ml), Razt. za inj.: 5 mg/1 ml	Ekstrapiramidni stranski učinki (pog. pri p. o. zdravljenju), posturalna hipotenzija, redki antiholinergični učinki.
	Levomepromazin NOZINAN	Razt. za inj.: 25 mg/1 ml**	Hitra i. v. umiritev: 2,5–5 mg (1 mg/min), ponoviti na 30 min, do umiritve.
	Promazin PRAZINE	p. o.: 10–25 mg, lahko ponavljamo vsako uro do umiritev 25–50 mg/dan v 2–4 odmerkah, postopno večamo do terapevt. učinkovitega odmerka	Hipoaktivni delirij: p. o., i. m., s. c., i. v.: 0,5–5 mg/4–12 h + p. p. ob halucinacijah ali agitaciji
		p. o.: 3–4×25–100 mg/dan + p. p.; maks. 300 mg/dan	Posturalna hipotenzija.
		mg	Ekstrapiramidna simptomatika (veliki odmerki), hipotenzija, antiholinergični učinki.

7. DELIRIJ

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
	Risperidon RISPERDAL Tbl.: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, Peroralna razt. (100 ml): 1 mg/ml, 1 kapalka = 3 ml = 3 mg RISPERIDON tbl.: 2 mg, 3 mg, 4 mg RISPOLUX Tbl.: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, p. o. razt. (100 ml): 1 mg/ml, 1 kapalka = 3 ml = 3 mg RISSET Tbl.: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg TORENDO-Q Orodisperz. tbl.: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg; Tbl.: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	p. o.: 2×0,5 mg + p.p.; povečujemo vsak drugi dan za 2×0,5 mg do maks. 10 mg/dan	Manj pogost pojav ektrapiramidnih stranskih učinkov.
	Olanzapin ZYPREXA Tbl.: 5 mg, 10 mg ZYPREXA VELOTAB Orodisperz. tbl.: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg OLANZAPIN ZOLRIX Tbl.: 5 mg, 10 mg Orodisperz. tbl.: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ZAPILUX Tbl.: 5 mg, 10 mg	p. o.: 2× 2,5–5 mg/oz. 5–10 mg zvečer., maks. 20 mg/dan; povečujemo odmerek v intervalih po 5 mg z min. 24 h razmakom	Ekstrapiramidna simptomatika pri odmerkih več kot 10 mg, somnolenco, povečanje telesne teže, zaprtje, suha usta.
Benzodiazepini*	Lorazepam LORAM LORSILAN Tbl.: 1 mg, 2,5 mg LORAZEPAM , Razt. za inj.: 2 mg/1 ml***	p. o., sublingv., s.c.: 0,5–2 mg/6–8 h	Sedacija, utrujenost, omotičnost, motnje koncentracije.
	Oksazepam OKSAZEPAM Tbl.: 10 mg PRAXITEN Tbl.: 15 mg	p. o.: 5–20 mg/6 h	Sedacija, utrujenost, omotičnost, motnje koncentracije.

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
	Benzodiazepini*	Midazolam DORMICUM , Tbl.: 7,5 mg, 15 mg, Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml	s. c., i. m.: 5 mg ponoviti na 30 minut do učinka, nato kont. s. c. inf. 30–100 mg/24 h. i. v.: 1–2 mg (0,25–0,5 mg pri starih, kahektičnih bolnikih) v počasnem bolusu (1 mg/30 s). Titiramo z odmerki po 1 mg do želene sedacije, nato kont. infuzija 20–100 mg/24 h.
	MIDAZOLAM TORREX	Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml	Previdnost pri i.v. aplikaciji – hipotenzija, tranzitorna apnea.

*Ne uporabljamo samih benzodiazepinov, ker lahko poslabšajo delirij (izjema je le odtegnitveni sindrom po prekinitvi uporabe benzodiazepinov).

8. SRBENJE

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Lokalni antihistaminiki	Dimetinden FENISTIL Gel (30 g): 1 mg/g	2–4×/dan namažemo kožo	
Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje	Dimetinden FENISTIL Peroralne kapljice (20 ml): 1 mg/ml Loratadin CLARITINE Tbl.: 10 mg, Sirup (120 ml): 1 mg/ml FLONIDAN Tbl.: 10 mg, Susp. (120 ml): 1 mg/ml RINOLAN Tbl.: 10 mg	p. o.: 3× 20–40 kapljic/dan p. o.: 10 mg/dan	Nesedirajoči antihistaminik, če po nekaj dneh ni učinka, prekinemo zdravljenje.
	Cetirizin ZYRTEC, Tbl.: 10 mg, Peroralna razt. (60 ml): 1 mg/ml LETIZEN Tbl.: 10 mg	p. o.: 10 mg/dan	Nesedirajoči antihistaminik, če po nekaj dneh ni učinka prenehaj.
	Ondansetron ZOFRAN Tbl.: 4 mg, 8 mg	p. o.: 3×4–8 mg/dan	Centralno delovanje, primerno ob holestazi, uremiji ali srbenju zaradi opioidov.
Antidepresivi	Paroksetin SEROXAT Tbl.: 30 mg PALUXON PAROGEN PAROXAT PLISIL Tbl.: 20 mg Mirtazapin: MIRZATEN Tbl.: 30 mg, 45 mg	p. o.: 10–20 mg/dan	Pogosto slabost, bruhanje in sedacija, po potrebi dodati še 5-HT ₃ antagonist. Indikacija: srbenje ob uremiji.

9. KOLCANJE

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Prokinetiki	Metoklopramid REGLAN Tbl.: 10 mg Peroralna razt. (120 ml): 5 mg/5 ml 5 ml = 5 mg = 1 žlička Razt. za inj.: 10 mg/2 ml***	p. o., s. c., i. v.; 3×10–20 mg/dan maks. 100 mg/dan s. c., i. v.: 30–100 mg/24 h inf.	Deluje kot centralni in periferni zaviralec D ₂ dopaminskih receptorjev, agonist 5-HT ₄ (stimulira peristaltiko), pri visokih odmerkih kot 5-HT ₃ antagonist. Ekstrapiramidna simptomatika.
	Domperidon TAMETIL Tbl.: 10 mg	p. o.: 3×10–20 mg/dan maks. 60 mg/dan	Ne prehaja možgansko-krvne pregrade, zato redko ekstrapiramidna simptomatika.
	Dimetikon/ simetikon SAB SIMPLEX Tbl.: 80 mg dimetikona = 84,7 mg simetikona Peroralne kapljice (30 ml): 69,2 mg simetikona/ml (1 ml = 25 gtts)	p. o.: 30–45 kapljic/4–6 h ali 1–2 tbl. med ali po jedi	
Kortikosteroidi			Uporaba smiselna pri jetnih in možganskih tumorjih, ker zmanjšujejo pritisk in draženje. Če ni učinka po 1 tednu prenehaj.
	Deksametazon DEXAMETHASON Tbl.: 0,5 mg*** Razt. za inj.: 4 mg/1 ml	p. o., s. c., i.v., i.m.: 4–8 mg/dan	Diabetes, gastritis, evforija, anksioznost, depresija, oralna kandidaza, zvišanje krvnega tlaka, proksimalna miopatija, nespečnost.
	FORTECORTIN Tbl: 2 mg***		
	Metilprednizolon MEDROL Tbl.: 4 mg, 16 mg, 32 mg	p. o.: 16–32 mg/dan	

9. KOLCANJE

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Ostalo	Haloperidol HALDOL Tbl.: 2 mg, 10 mg Peroralne kapljice: 2 mg/1 ml (10 ml), 1 mg = 10gts=0,5ml 10 mg/1ml (30 ml), Razt. za inj.: 5 mg/1 ml	p. o. (tbl. ali kapljice): 2–3×0,5–1,5 mg/dan, maks. 3–5 mg/dan s. c.: 3×1,5–3 mg, s. c. inf.: 2,5–5 mg/24 h	Deluje kot močan blokator dopaminskih D2 receptorjev, šibkeje blokira tudi histaminske, muskarinske in serotoninske receptorce.
	Levomepromazin NOZINAN Tbl.: 25 mg, 100 mg Razt. za inj.: 25 mg/1 ml**	Začetni odmerek: p. o.: 1–2×6,25 mg/dan, maks. 6,25–25 mg/dan	Deluje tudi kot široko-spektralni antiemetik. POZOR: številni stranski učinki, zato uporabljati v najnižjih delujočih odmerkih!
	Baklofen BACLOFEN POLPHARMA, LIORESAL Tbl.: 10 mg, 25 mg***	p. o.: 5–20 mg/8 h, začnemo s 3×5 mg nato na 3 dni zvišujemo odmerek	Deluje kot mišični relaksant z centralnim delovanjem, ukinjamo ga počasi.
	Nifedipin ADALAT OROS Tbl. s pod. spr.: 30 mg, 60 mg CORDIPIN Tbl. s pod. spr.: 20 mg, 40 mg NIFECARD Tbl. s pod. spr.: 30 mg	p. o.: 5–20 mg/8 h	Deluje kot blokator kalcijevih kanalčkov. Ne uporabljam pri hipotenzivnih bolnikih!
	Midazolam DORMICUM Tbl.: 7,5 mg, 15 mg, Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml	p. o.: 7,5–15 mg/dan i. v., i. m., s. c.: 2,5–10 mg/dan	Primeren pri hudem kolcanju, neodzivnem na druga zdravila. Ko se simptomi umirijo, postopno znižuj in prilagaj dozo. POZOR: ob i. v. aplikacijah lahko povzroča respatorno odpoved.
	MIDAZOLAM TORREX Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml		Specifičen antagonist: flumazenil (Anexate): 0,3 mg, počakamo 1 minuto, ponavljamo odmerke 0,1 mg do učinka oz. do maks. 2 mg.

10. BOLEČINA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Neopiodini analgetiki	Paracetamol DALERON LEKADOL PANADOL Tbl.: 500 mg Orodisperz. tbl.: 500 mg	p. o.: 500 mg–1 g/4–6 h, maks. 4 g/dan	Ne uporabljamo pri hujši okvari jeter.
	DALERON, LEKADOL Zrnca, vrečke z zrnji: 5 g zrnc (500 mg paracetamola + 300 mg oz. 20 mg askorbinske kisline)	Rektalno: 500 mg–1 g/4–6 h, maks. 4 g/dan	
	PARACETAMOL (galenski laboratorijski) Svečke: 500 mg		
	Paracetamol in tramadol ZALDIAR DORETA Tbl.: 325 mg paracetamola + 37,5 mg tramadola	p. o.: 3–4×1 tbl./dan, maks. 8 tbl./dan	Glej tudi stranske učinke tramadola.
	ZALDIAR Šumečé tbl.: 325 mg paracetamola + 37,5 mg tramadola		
	Diklofenak NAKLOFEN OLFEN VOLTAREN Tbl.: 50 mg	p. o.: 2–3×50 mg 2×75 mg oz. 1×100 mg/dan	Nesteroidni antirevmatiki: razjeda želodca in dvajstnika, vpliv na delovanje ledvic in strjevanje krvi.
	NAKLOFEN DUO DICLO DUO DICLO JET Kaps.: 75 mg	Rektalno: 2–3×50 mg/dan	
	NAKLOFEN SR VOLTAREN R Tbl. s podaljš. sprošč.: 100 mg	i. m.: 1–2×75 mg/dan	
	OLFEN Kaps. s podaljš. sprošč.: 100 mg		
	NAKLOFEN Svečke: 50 mg		
	VOLTAREN Svečke: 25 mg		
	NAKLOFEN Razt. za inj.: 75 mg/3 ml		
	OLFEN Razt. za inj.: 75mg/2 ml (+ 20 mg lidokainjevega klorida)		

10. BOLEČINA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Ne opioidni analgetiki	NEODOL PASSE Razt. za inj.: 75 mg/250 ml (+ 30 mg orfenadrinijevega citrata)	i.v.: 250 ml raztopine (= 75 mg diklofenača) v počasni infuziji (1,5–2 h), izjemoma 2 steklenici po 250 ml/v presledku najmanj 8 h		Srednje močni opioidi	Tramadol TADOL, TRAMAL Kaps.: 50 mg TADOL, TRAMAL Tbl. s podaljš. sprošč.: 100, 150, 200 mg	p. o.: 50 mg/4–6 h 100–200 mg/12 h, maks. 400 mg/dan, izjemoma do 600 mg pri onkoloških bolnikih	Slabost, omotica, potenje, bruhanje, zaprtje, glavobol, zaspanost, potenje.
	Ketoprofen KETONAL Kaps.: 50 mg Tbl.: 100 mg Tbl. s podaljš. sprošč.: 150 mg Svečke: 100 mg Razt. za inj.: 100 mg/2 ml	p. o.: 3×50 mg/dan, 2×100 mg ali 1×150 mg ali 1×200 mg/dan rektalno: 1–2×100 mg/dan i.m.: 1–2×100 mg/dan i.v.: v kratki (30–60 min.) do dolgotrajni inf. (do 48 h). Maks. odmerek 200 mg/dan.		TRAMUNDIN Tbl. s podaljš. sprošč.: 100 mg	rektalno: 100 mg do 4×/dan, izjemoma do 600 mg pri onkoloških bolnikih		
	Naproksen NALGESIN Tbl.: 275, 550 mg NAPROSYN Tbl.: 375, 500 mg	p. o.: 275–375 mg/6–8 h 500–550 mg/12 h, maks. odmerek 1650 mg/dan, največ za 2 tedna		TRAMACUR Kaps. s podaljš. sprošč.: 100, 150 mg	s.c., i.m., i.v.: 50–100 mg/6–8 h, maks. 400 mg/dan		
	Ibuprofen BONIFEN Tbl.: 200 mg BRUFEN Tbl.: 400, 600 mg IBUPROFEN Tbl.: 400, 600, 800 mg	p. o.: 400–800 mg/4–6 h, maks. 2400 mg/dan		TADOL, TRAMAL Peroralne kapljice: 100 mg/ml (10 mL), 1 ml = 40 gtt = 100 mg 1 gtt = 2,5 mg tramadola Peroralne kapljice: 100 mg/ml (96 mL), z odmerno črpalko 8 pritiskov = 1 ml = 100 mg			
	Natrijev metamizolat ANALGIN Tbl.: 500 mg Razt. za inj.: 2,5 g/5 ml	p. o.: 500–1000 mg/6–8 h, maks. 4000 mg/dan i.v. ali i.m.: 2–5 ml (1–2,5 g), maks. 10 ml (5 g)/dan	Injicirati počasi (največ 1 ml/min) – možna hipotenzija ob hitrem injiciranju, možen pojav alergije in zavore kostnega mozga.	TADOL, TRAMAL Svečke: 100 mg TADOL, TRAMAL Razt. za inj.: 50 mg/ml, 100 mg/2 ml			
				Kodein KODEINIJEV FOSFAT Alkaloid Tbl.: 30 mg KODEINSKE KAPLJICE (20 mL) 50 mg/ml: 1 ml = 20 gtt = 50 mg 1 gtt = 2,5 mg kodeina	p. o.: 15–30 mg/6–8 h, maks. enkratni odmerek 90 mg, maks. 240 mg/dan	Zaspanost, zmedenost, halucinacije, slabost, bruhanje, zaprtje, glavobol, omotičnost, vrtoglavica.	
				Dihidrokodein DHC CONTINUS (zdravilo ni več registrirano in ni na tržišču) Tbl. s podaljš. sprošč.: 60 mg, 90 mg, 120 mg	p. o.: 60–120 mg/12 h, maks. 240 mg/dan	Zaspanost, zmedenost, halucinacije, slabost, bruhanje, zaprtje, depresija dlanja.	

10. BOLEČINA

Skupina zdravila	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Močni opioidi	Morfín Morfini s takojšnjim sproščanjem SEVREDOL Tbl.: 10, 20 mg MORFINSKE/ ANALGETIČNE KAPLJICE Peroralna raztopina 20 mg/ml (20ml), 1 ml = 20gts = 20mg, 1 gtt = 1 mg MORFIN ALKALOID Razt. za inj.: 20 mg/1 ml*** MSI MUNDIPHARMA Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml***	Individualno odmerjanje p. o.: 10–30 mg/4 h s. c. ali i. v.: 5–20 mg/4–6 h (1/3 p. o. odmerka)	Zaprtje, slabost, bruhanje, sedacija, bronhospazem, dispejna, depresija dihanja, zmedenost, vtoglavica, ak. retence urina, srbenje, omotica, sinkopa, glavobol, suha usta.	Močni opioidi	Fentanil Fentanil s takojšnjim sproščanjem ABSTRAL Podjezične tbl.: 100, 200, 300, 400, 600, 800 µg	Individualno odmerjanje, sublingv. 100–800 µg p. p. do 4×/dan	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje.
	Morfín z nadzorovanim sproščanjem MST CONTINUS Tbl. s podaljš. sprošč.: 10, 30, 60, 100 mg* (zdravilo je v ukinjanju) Hidromorfon Hidromorfon s takojšnjim sproščanjem PALLADONE** Kaps.: 1,3 mg, 2,6 mg**	Individualno odmerjanje p. o.: 30–90 mg/12 h oz. glede na iztitirani odmerek opioida, tablete lahko damo rektalno Individualno odmerjanje p. o.: 1,3 ali 2,6 mg/4–6 h	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje.	INSTANYL* Raztopina – pršilo za nos: 50, 100, 200 µg/vpih	Individualno odmerjanje, intranas. 50–400 µg p. p. do 4×/dan	Indikacija za zdravili Abstral in Instanyl* – obvladovanje prebjajoče bolečine pri odraslih bolnikih z rakom, pri katerih se kronična bolečina že zdravi z opioidi Postopek titracije zdravila Abstral opisan na koncu knjižice.	
	Hidromorfon z nadzorovanim sproščanjem JURNISTA OROS tbl. s podaljš. sprošč.: 4, 8, 16, 32, 64* mg PALLADONE SR Kaps. s podaljš. sprošč.: 2*, 4 , 8, 16, 24 mg	Individualno odmerjanje p. o.: Začetni odmerek je 4–8 mg/ dan oz. glede na iztitirani odmerek opioida p. o.: Začetni odmerek je 2–4 mg/12 h oz. glede na iztitirani odmerek opioida, vsebino kapsule lahko potresememo po hladni, redki hrani	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje.	DUROGESIC Transdermalni obliž: 12, 25, 50, 75, 100 µg/h glede na iztitirani odmerek opioida, menjava obliža na 72 h EPUFEN Transdermalni obliž: 12.5, 25, 50, 100, 150 µg/h VICTANYL Transdermalni obliž: 25, 50, 75*, 100 µg/h	Transdermalno: Začetni odmerek 12–25 µg/h oz. glede na iztitirani odmerek opioida, menjava obliža na 72 h Do 25 % bolnikov potrebuje zamenjavo obliža že po 48 h.	Transdermalno le pri stabilni bolečini, počasni učinek prvih odmerkov (prvih 24 h lahko bolnik potrebuje dodatno analgezijo), podaljšan učinek zadnjega odmerka.	
				Buprenorfin Buprenorfin z nadzorovanim sproščanjem TRANSTEC Transdermalni obliž: 35, 52.5, 70 µg/h	Individualno odmerjanje, transdermalno: Začetni odmerek je 35 µg/h oz. glede na iztitirani odmerek opioida, menjava obliža 2×tedensko. Maks. priporočeni odmerek 140 µg/h	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje.	
						Transdermalno le pri stabilni bolečini, počasni učinek prvih odmerkov (prvih 24 h lahko bolnik potrebuje dodatno analgezijo), podaljšan učinek zadnjega odmerka.	

10. BOLEČINA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe	Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Močni opioidi	Oksikodon Oksikodon z nadzorovanim sproščanjem OXYCONTIN, OKSIKODON Lek Tbl. s podaljš. sprošč.: 5*, 10, 20, 40, 80 mg	Individualno odmerjanje p. o.: Začetni odmerek 10–20 mg/12 h oz. glede na iztitirano odmerek opioida	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje.	Dodata na zdravljenje bolečine	Deksametazon DEXAMETHASON Tbl.: 0,5 mg*** Razt. za inj.: 4 mg/ml FORTECORTIN Tbl: 2 mg***	Individualno odmerjanje	Gastritis, diabetes, evforija, anksioznost, depresija, ↑ RR, proksimalna miopatiјa.
	Oksikodon/nalokson TARGINACT* Tbl. s podaljš. sprošč.: 5/2,5 mg, 10/5 mg, 20/10 mg, 40/20 mg	p. o.: Začetni odmerek 5/2,5 mg do 10/5 mg/12 h oz. glede na iztitiran odmerek opioida. Maks. priporočen odmerek 40/20 mg/12 h		Metilprednizolon MEDROL Tbl.: 4, 16, 32 mg	Individualno odmerjanje		
	Metadon HEPTANON Tbl.: 5 mg HEPTANON Peroralne kapljice: 10 mg/ml (10 ml), 1 ml = 30 gts = 10 mg 1 gtt = 0,33 mg metadona HEPTANON Razt. za inj.: 10 mg/1 ml	Individualno odmerjanje p. o.: Začetni odmerek 5–10 mg/6–8 h oz. glede na iztitiran odmerek opioida	Utrjenost, omotica, zmedenost, zaprtje, suha usta, slabost in bruhanje, upočasnjeno dihanje. Dolg razpolovni čas.	Zdravila za nevropatsko bolečino	Amitriptilin AMYZOL Tbl.: 10, 25 mg	p. o.: 10–25 mg zvečer, do 75 mg/dan	Suha usta, zaspornošč, glavobol, zamegljen vid, hiter srčni utrip, zastajanje seča, zaprtje.
		s. c.: Začetni odmerek 2,5–10 mg/4–6 h, oz. glede na iztitiran odmerek opioida		Pregabalin LYRICA Kaps.: 25, 75, 150, 225, 300 mg	p. o.: Začetni odmerek 2×25 mg, titracija do odmerka 2×150 mg/dan		Sedacija, zaspornošč, vrtoglavica, glavobol.
				Gabapentin NEURONTIN, GABAGAMMA Kaps.: 100, 300, 400 mg NEURONTIN Tbl.: 600, 800 mg	p. o.: Začetni odmerek 300 mg/dan v 3 odmerkih, postopoma povečujemo odmerek, maks. dnevni odmerek 3600 mg v 3 odmerkih		Zaspanost, utrujenost, omotica, glavobol, slabost, bruhanje, nistagmus, ataksija, pareseze.
				Karbamazepin TEGRETOL Tbl.: 200 mg Tbl. s podaljš. sprošč.: 400 mg	p. o.: 100–200 mg v 1 ali 2 odmerkih, maks. 1200–2000 mg/dan v 2 odmerkih		Vrtoglavica, omotičnost, zaspanost, ataksija.
				Klonazepam RIVOTRIL Tbl.: 0,5 mg, 2 mg	p. o.: Začetni odmerek 0,5 mg zvečer, maks. 4–8 mg v 2–3 odmerkih		Utrjenost, zaspanost, mišič. oslabilost, omotica, vrtoglavica, ataksija.
				Lidokain VERSATIS Oblž: 5% lidokainski obliž	1–3 obliži za 12 h/dan na boleče mesto, največ 3 obliži/dan		Oblži odstranimo po 12 h, v naslednjih 12 h ne smemo nalepiti novih.
				Ketamin KETANEEST S Razt. za inj.: 25 mg/ml***	s. c.: 25 do 300 mg/dan		Nemir, halucinacije, zvišan krvni tlak. Dodajamo pomirjevala.

*Antidot za opioide: NALOKSON (NALOXONE HYDROCHLORIDE 0,4 mg/ml).

10. BOLEČINA

Skupina zdravil	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
Bifosfonati (ob bolečini zaradi kostnih metastaz)	Pamidronska kislina AREDIA	i.v.: 2–4 h infuzija, 90 mg/4 tedne	Kratkotrajna vročina in gripi podobno stanje z mrzlico, utrujenost, hipokalcemija, osteonekroza.
	Prašek in vehikel za raztopino za infundiranje: 15, 30 mg		
	PAMITOR		
	Koncentrat za razt. za infundiranje: 30 mg/2 ml, 90 mg/6 ml		
	Zoledronat	i.v.: 15 minutna infuzija 4 mg/4 tedne	
	ZOMETA		
	Koncentrat za raztopino za infundiranje: 4 mg/5 ml		
	ACLASTA		
	Razt. za infundiranje: 5 mg/100 ml		
	Ibandronat	p. o.: 50 mg/dan	
	BONDRONAT	i.v.: 1–2 h inf., 6 mg/4 tedne	
	Tbl.: 50 mg		
	Koncentrat za razt. za infundiranje: 6 mg/6 ml		
	Klodronska kislina	p. o.: 800–1600 mg/dan	
	BONEFOS	i.v.: 1–2 h inf.	
	Tbl. 800 mg	1500 mg/4 tedne (izjemoma s.c.)	
	Koncentrat za razt. za infundiranje: 300 mg/5 ml		

11. UMIRANJE

Simptomi	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
BOLEČINA	Morfín MORFIN ALKALOID Razt. za inj.: 20 mg/1 ml***	Individualno odmerjanje. Bolnik še ni jemal močnih opioidov: s. c. 2,5–5 mg/4 h + p. p. Bolnik je jemal močne opioide: s. c. v trajni infuziji: 1/3 ekvianalgetičnega peroralnega dnevnega odmerka morfina/ dan (glej tabelo primerjalnih odmerkov opioidov). Za prebijajočo bolečino dodamo 1/6 s. c. dnevnega odmerka morfina s. c., p. p. ali s. c./4 h: 1/6 ekvianalgetičnega s. c. dnevnega odmerka morfina/4 h + p. p.	Bolniki s hudo ledvično in/ali jetrno infuencijo potrebujejo prilagojene nižje odmerke opioidov ali odmerjanje v daljših časovnih intervalih.
DISPNEA	Morfín MORFIN ALKALOID Razt. za inj.: 20 mg/1 ml***	s. c.: Začetni odmerek: 2,5–5 mg/4 h + p. p. (titriramo do učinka, ponavljamo lahko na 20 min). Če bolnik že prejema opioide, povečamo odmerek za 25 %	Uporaba kisika je smiselna le pri hipoksičnih bolnikih, katerim je že predhodna uporaba kisika zmanjševala občutek dispnee.
	MSI MUNDIPHARMA Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml***		
	Midazolam DORMICUM Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml	s. c.: Začetni odmerek: 2,5–10 mg/4 h + p. p. ali z 2,5–10 mg titriramo do učinka, ponavljamo lahko na 30 min, nato nadaljujemo s kont. s. c. inf. 5–30 mg/24 h, maks. odmerek: 80 mg/24 h	
	MIDAZOLAM TORREX Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml		
	Lorazepam LORSILAN, LORAM Tbl.: 1 mg, 2,5 mg	sublingv.: Začetni odmerek: 1–2,5 mg, lahko ponovimo po 30 min, maks. odmerek 6 mg/24 h	

11. UMIRANJE


Simptomi	Ime zdravila	Odmerjanje in pot vnosa	Stranski učinki in opombe
NEMIR	Midazolam	s. c.: Začetni odmerek: 2,5–10 mg/4 h + p. p. ali z 2,5–10 mg titriramo do učinka, ponavljamo lahko na 30 min, nato nadaljujemo s kont. s. c. inf.	Kadar ne pride do umiritve pri 30 mg/24 h, premisliti o priključitvi haloperidola pred nadaljnim poviševanjem midazolama.
	MIDAZOLAM TORREX	Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 15 mg/3 ml	5–30 mg/24 h, maks. odmerek: 80 mg/24 h)
TERMINALNO HROPENJE	Butilskopolamin BUSCOPAN	s. c.: 10–20 mg/4–6 h ali z 10–20 mg titriramo do učinka, ponavljamo lahko na eno uro do maks. dnevnega odmerka 120 mg Kont. s. c. infuzija: 40–120 mg/24 h	Delovanje: zmanjšuje sekrecijo v dihalih in prebavilih.

12. DODATEK

Primerjalni odmerni opioidov

morfín (mg)	30	60	120	180	240	300	360	420	480
tramadol (mg)	150	300	600	*	*	*	*	*	*
dihidrokodein (mg)	120	240	*	*	*	*	*	*	*
oksikodon (mg)		30	60	90	120	150	180	210	240
hidromorfon (mg)	4	8	16	24	32	40	48	52	64
fentanil (mcg/h)	12,5	25	50	75	100	125	150	175	200
buprenorfin (mcg/h)		35	52,5	70	105	122,5	140	*	*
morfín s takojšnjim sproščanjem (mg)	5	10	20	30	30	40	40	40	50
• večji odmerek se ne priporoča									

POSTOPEK TITRIRANJA ZDRAVILA ABSTRAL¹



Jakost (v mikrogramih) prve podjezične tablete na epizodo prebijajoče bolečine	Jakost (v mikrogramih) dodatne (druge) podjezične tablete, ki se jo da 15-30 minut po prvi podjezični tableteti, če je to potrebno
100	100
200	100
300	100
400	200
600	200
800	-

¹ Zdravilo ABSTRAL je namenjeno za obvladovanje prebijajoče bolečine pri odraslih bolnikih z rakom, pri katerih se kronična bolečina že zdravi z opioidi in ki to zdravljenje dobro prenašajo.

12. DODATEK

ZDRAVILA, ki jih lahko predpišemo preko 24 h podkožne črpalke:

Indikacija/odmerek	Opombe
Morfín	Osnovni analgetik Glede na potrebe
MORFIN ALKALOID***	• glej poglavje bolečina
Razt. za inj.: 20 mg/1 ml	
MSI MUNDIPHARMA***	
Razt. za inj.: 10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml	
Ketamin	Nevropsatska bolečina:
KETANEST S***	25-300 mg/24 h
Razt. za inj.: 250 mg/10 ml	• glej poglavje bolečina
Metoklopramid	Slabost, bruhanje:
REGLAN***	20-120 mg/24 h
Razt. za inj.: 10 mg/2 ml	• prokinetik • ne pri obstrukciji črevesja
Haloperidol	Slabost, bruhanje:
HALDOL***	2,5-5 mg/24 h
Razt. za inj.: 5 mg/1 ml	Delirij
Butilskopolamin	Sekrecija dihal, obstruk-
BUSCOPAN***	cija črevesja, terminalno
Ampula: 20 mg/1 ml	hropenje: 40-120 mg/24 h
Midazolam	Anksioznost, mišični krči,
DORMICUM	epileptični napadi, termi-
MIDAZOLAM TORREX	nalni delirij
Razt. za inj.: 5 mg/5 ml, 50 mg/10 ml,	Titracija do učinka
MIDAZOLAM TORREX	• anksiolitik: 5-10 mg/24 h • mišični relaksant: 5-20 mg/24 h • antiepileptik: 20-30 mg/24 h • sedativ: 20-80 mg/24 h
Razt. za inj: 15mg/3ml	
Deksametazon	Obstrukcija črevesja,
DEXAMETHASON	povišan intrakranilani tlak,
Razt. za inj.: 4 mg/1 ml	slabost, bruhanje: 2-16 mg/24 h

RECEPTURE:

ANALGETIČNE KAPLJICE

(20 ml): 1 gtt = 1 mg morfina

RECEPTURA – OI:

Morphini chloridum plv.	0,4 g
Aqua chloroformiata	4,0 g
Aqua purificata	13,6 g
Sirupus simplex	2,0 g

RECEPTURA – ZUNANJE LEKARNE:

Morphini chloridum plv.	0,4 g
Sirupus simplex	2,0 g
Aqua ad injectabilia	17,6 g

KODEINSKE KAPLJICE

(20 ml): 1 gtt = 2,5 mg kodeina

Codeini plv.	1,0 g
Aqua destil.	ad 20 g

1 mala žlička (čajna) = 5 ml; 1 velika žlica = 15 ml; 20 kapljic = 1 ml

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

615.03:616-036.8-083

ZDRAVILA za uporabo v paliativni medicini / [avtorji
Jožica Červek ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Onkološki
inštitut, 2012

ISBN 978-961-6071-73-4

1. Červek, Jožica

259444736